

Tapir™

HERBICIDE

**ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN GRANEN, GRASZAADTEELT,
VOEDERGRASLAND, GRASVEGETATIE**

Toelatingsnummer: 15258 N (W1)

Bevat : EC - emulgeerbaar concentraat op basis van 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl +
2,5 g/L florasulam + 80 g/L clopyralid

Toelatingshouder :

Dow AgroSciences B.V.
Kunstlaan 44
B-1000 Brussel, België

Verdeeld door :

Dow AgroSciences B.V.
Postbus 522
4530 AM Terneuzen, Nederland
Tel : 0164 444000
Website: www.corteva.nl

™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer
and their affiliated companies or respective owners

Lotnummer : zie op de fles

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
+31 30 2748888 (alleen voor artsen).

STORL
VERPAKKING

**BEDRIJFS-
AFVAL**



5 L e PET

koolwaterstoffen, C10-C13,aromaten, <1% naftaleen

GEVARENPICTOGRAMMEN



GHS07



GHS08



GHS09

SIGNAALWOORD : GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN

- | | |
|------|---|
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie |
| H332 | Schadelijk bij inademing |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen |

VOORZORGSMATREGELEN

- | | |
|----------------|---|
| P280 | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. |
| P301+P310 | NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts... raadplegen. |
| P302+P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen. |
| P304+P340 | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P331 | GEEN braken opwekken. |
| P501 | Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. |
| SP1 | Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. |

AANVULLENDE INFORMATIE

- | | |
|--------|--|
| EUH401 | Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |
|--------|--|

**Artwork Free area for
in-house print of
2D data matrix code**

0110714861912



WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing (*)	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Wintergraan (m.u.v. kanariezaad)	Breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomergraan	Breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Graszaadteelt	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-
Voedergrasland	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	7 dagen tussen toepassing en beweiding en/of maaien
Grasvegetatie	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-

(*) Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

In de teelt van graszaadteelt, voedergrasland en grasvegetatie het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Stro van behandeld graan en behandeld gras mag niet gebruikt worden voor mulching, compostering of teelt op stobalen.

Bij gevestigd voedergrasland en grasvegetatie is toepassing toegestaan gedurende het groeiseizoen. Bij jong voedergrasland en grasvegetatie is na-opkomst toepassing toegestaan vanaf februari tot en met september.

Volggewassen

Als volggewas kunnen in hetzelfde jaar veilig granen, koolzaad en koolgewassen (geplant) en gras geteeld worden, in koolzaad is een tijdelijke licht groeiremming mogelijk. In het volgende jaar gelden geen beperkingen.

Resistentiemanagement:

Dit middel bevat de werkzame stoffen clopyralid, fluroxypyr-meptyl en florasulam. Clopyralid behoort tot de synthetische auxinen en fluroxypyr behoort tot de pyridine carboxylic acids, beide behoren tot HRAC code O. Florasulam behoort tot de triazolopyrimidines (HRAC code B). In Nederland zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code B. Omdat er binnen deze groep

kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Maak niet langer gebruik van 2,4-D ONLY

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onderzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of in voorraad hebben van dit middel.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

AANBEVELINGEN

Algemeen

TAPIR is een bladherbicide met systemische werking. Het middel werkt door de combinatie van 3 werkzame stoffen tegen een breed scala aan breedbladige onkruiden. Gevoelige onkruiden zijn bijv. paardenbloem, muur, ridderzuring, kamille, klein kruiskruid, akkermelkdistel, akkerdistel, kleeftkruid, herderstasje, kleine veldkers, brandnetel, hennepnetel, zwaluwtong, perzikkruid, varkensgras, zwarte nachtschade en haag- en akkerwinde.

Het beste resultaat wordt verkregen op goed groeiende onkruiden, dus bij groeiende weersomstandigheden. Het middel dient verspoten te worden op een droog gewas. Na toepassing dient het minimaal 1 uur droog te blijven.

Attentie

Het middel kan schade doen aan naburige gewassen bij overwaaien van de spuitvloeistof; de toepassing dient daarom zorgvuldig te geschieden.

Aanbevelingen per gewas

In voedergrasland

Onder voedergrasland wordt verstaan: weiland en maaigrasland.

Dosering: 1,25 - 1,5 L/ha.

Tegen zuring de hoogste dosering gebruiken (1,5 L), gespoten als de zuringplanten veel blad hebben (zuring minimaal 30 cm groot) bij groeiende weerscondities (hoge RV en T > 15°C). Ter versterking op zuring kan eventueel nog 0,3 L Starane Top worden toegevoegd aan de 1,5 L Tapir per ha.

De toepassing kan plaatsvinden in het voorjaar, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten vanaf ± 3 weken na een maaibeurt.

In granen

Tapir kan versterkt worden tegen meldes met een daartegen werkzaam graanherbicide. Menging met de meeste fungiciden en groeiregulatoren is mogelijk. Tapir is een EC formulering. Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij een snelgroeiend gewas onder scherp zonnige omstandigheden, kan bij menging van een triazool met een EC een tijdelijke gewasreactie optreden.

Waarschuwingen betreffende strogebruik

- Indien na de oogst het stro niet wordt afgevoerd, dan dient het stro in het najaar goed ingewerkt te worden.
- Het stro niet als voedingsbodem voor paddestoelenteelt gebruiken.
- Gebruik het stro (of compost van stro) niet voor het afdekken van gevoelige gewassen zoals snijbloemen, sla en peulvruchten.

Residuen van de werkzame stof clopyralid in gewasresten die niet volledig zijn verteerd kunnen een effect hebben op het volggewas aardappelen in de vorm van een lichte gewasreactie. Dit kan met name bij pootaardappelen problemen geven bij selectie/keuring. Zorg er daarom in deze situatie voor dat gewasresten goed verteerd of afgevoerd zijn.

In wintergranen (met uitzondering van kanariezaad), zomertarwe en zomergerst:

De toepassing dient plaats te vinden vanaf begin uitstoeiing tot vlagbladstadium (BBCH 13-39).

Dosering: 1 L/ha.

In zomerrogge en zomerhaver:

De toepassing dient plaats te vinden in de lente vanaf begin uitstoeiing tot 2-knoopstadium (BBCH 13-32).

Dosering: 1 L/ha

In graszaadteelt

De toepassing kan plaatsvinden vanaf 3-bladstadium, van februari tot en met september.

Dosering: 1,5 L/ha

In grasvegetatie

Onder grasvegetatie wordt verstaan gazons, speelweides, grasbermen en sportvelden (incl. graszodenteelt en golfterreinen). Toepassen vanaf het 3-bladstadium.

Dosering: 1,5 L/ha

REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik van TAPIR, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

TE VOLGEN STAPPEN BIJ HET REINIGEN

Ledig het spuittoestel volledig op het behandeld veld. Ledig zowel het spuitvat, de spuitarmen als de leidingen. Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige wanden van het spuittoestel met een hogedrukspuit, in geval van polyethyleen of metaalachtige tank, of met een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk.

Vul daarna het spuitvat met een oplossing die 0,3 L ammoniak 20% bevat per 100 L water. Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten. Ledig daarna het spuitvat en de spuitarmen en reinig met proper water. In alle gevallen, steeds de spuitdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met goede afwaszeep. Het spoelwater verspreiden over het gewas.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INDAEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) **+31 30 2748888** (alleen voor artsen).

CLASSIFICATIE INFORMATIE

Koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen

GEVARENPICTOGRAMMEN : GHS07, GHS08, GHS09

SIGNAALWOORD : GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P310

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts... raadplegen.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.

P304+P340

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P331

GEEN braken opwekken.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.